

2018年11月改訂

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

瞳の健康を考えた1回使い切りタイプ ティアーレ®シリーズ

ものもらい・結膜炎の治療に

ティアーレ®抗菌目薬

第2類医薬品

特長

有効成分が目の表面に **長くとどまる**

ヒアルロン酸Na
(粘稠剤として)
配合

(はやり目)
結膜炎



ものもらい

(まぶたのただれ)
眼瞼炎



かゆみ

抗菌成分
サルファ剤

細菌に対して強い抗菌力を持つサルファ剤を
基準内最大濃度配合※

[スルファメトキサゾールナトリウム 4.0%]

W配合
抗炎症成分

グリチルリチン酸二カリウムとイブシロン-
アミノカプロン酸が目の炎症を効果的に
しずめます。

防腐剤
フリー

無菌充てん・防腐剤無添加の「1回使い切り
タイプ」で、使うときいつでも新鮮・清潔です。
小さなお子様にもご使用いただけます。

※眼科用薬製造(輸入)承認基準

保管・取扱注意

・品質を保つため、保存する場合は内袋と箱に入れてください。

・本品は、無色から微褐色の点眼薬です。使用時に微褐色に着色している場合がありますが、有効成分であるサルファ剤によるものですので、ご心配ありません。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
・長期連用しないでください。



相談すること

1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人 ・ ぼやけ目の痛み

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮フ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ |

3 3～4日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


【効能・効果】 ものもらい、結膜炎(はやり目)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)

【用法・用量】 1日5～6回、1回2～3滴点眼する。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (3) キャップ部分を軽く引っ張りながら、ゆっくりまわして開封してください。
(勢いよく開封すると、薬液が飛び散る場合があります。)
- (4) 点眼用におみ使用してください。

【成分・分量】 スルファメトキサゾールナトリウム 4.0%
グリチルリチン酸二カルシウム 0.2%
イブシロン-アミノカブロン酸 1.0%
添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ヒプロメロース、ヒアルロン酸ナトリウム、pH調節剤を含有する。



【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 本品は、光による薬液の変質を防ぐため、着色袋を使用しておりますが、保存する場合は内袋と箱に入れるなど、光の当たらない所に保管してください。なお、冷蔵庫では保管しないでください。
- (3) 本品は、無色から微褐色の点眼薬です。使用時に微褐色に着色している場合がありますが、有効成分であるサルファ剤によるものですので、ご心配ありません。
- (4) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (5) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (6) 他の人と共用しないでください。
- (7) 使用後に薬液が残っていても、再使用しないでください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、一度内袋を開封した後はすみやかに使用してください。
- (9) 本剤を携帯する際、スポンの後ろポケット等に入れしないでください。
(キャップ部分が折れて開いてしまう恐れがあります。)
- (10) 本剤を点眼後、口中に苦味または甘みを感じることがありますが、本剤の有効成分によるものですので、ご心配ありません。
- (11) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。